



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на здравеопазването  
Регионална здравна инспекция  
Кърджали

вх.№ 32-00-43

(Получено на 11.03.2020,  
Община Крумовград)

6600 Кърджали, ул. "Ген. Вл. Стойчев" № 2  
тел.: (+ 359 361) 6 02 95; факс: (+ 359 361) 6 20 95

e-mail: rzi.kardjali@gmail.com  
web: www.rzi-kardjali.com

изх.№03-200-1/11.03.2020г.

до

ВСИЧКИ КМЕТОВЕ НА

ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Н. Димитров  
Ф. пистан  
да се сведе до  
заначето на  
ръководителите и  
персонал за  
изпълнение  
относно: Инструктивни материали във връзка с COVID-19

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ,

С цел превенция разпространението на COVID-19 и опазване здравето на населението, дирекция „Здравеопазване“ в поверената Ви община, да бъде подробно информирана за всички необходими действия, които да се предприемат от тяхна страна за подпомагане на дейността на медицинските специалисти и останалия персонал в детските и учебни заведения.

Стриктно да се спазва „Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19“, изготвен от експерти на НЦЗПБ.

Моля да уведомите работодателите от територията на общината да спазват стриктно приложения Алгоритъм.

**Приложение:** Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

С уважение,

ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Главен секретар

за Директор на РЗИ-Кърджали  
съгласно Заповед РД-01-135 от 22.06.2018 г.



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001

Интегрирана система за управление на качеството

# **АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19**

Предложението алгоритъм е разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците, управителите и работещите в различни обекти с обществено предназначение информация за изискванията и стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19.

Алгоритъмът включва следните основни направления:

1. Избор на дезинфектант
2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
3. Начини на приложение на дезинфектантите
4. Допълнителни изисквания
5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи
6. Хигиена на ръцете

## **1. Избор на дезинфектант**

**1.1.** Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти.

**1.2.** Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които се знае, че са чувствителни на редица дезинфектанти - хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения. Към момента все още се събират данни конкретно за COVID-19 и насоките в международната общност се основават на познанията за други подобни на COVID-19 вируси.

**1.3.** Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. *Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.*

**1.4.** В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за **Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди**, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или **Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“** и/или за **Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“**.

**1.5.** Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписането на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

**1.6.** Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

## **2. Установяване на критични точки и кратност на обработките**

**2.1.** За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често

докосваните повърхности (подове в училища, детски заведения и клубове, молове, бизнес сгради, перони на метростанции; подове в коли на градски транспорт, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници, клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място.)

**2.2.** Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция.

**2.3.** При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място честотата на дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличи, като в зависимост от обектите тя може да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или след всеки курс (например при транспортните средства).

### **3. Начини на приложение на дезинфектантите**

*Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, които трябва да се разредят с вода преди употреба.*

#### **3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)**

**3.1.1.** Препоръчително е използването на алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбинации с тях) под формата на спрей, които са готови за употреба.

**3.1.2.** Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/гампон, предварително напоени с дезинфектанта.

**3.1.3.** Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с дезинфектанта.

**3.1.4.** Третираната повърхност се оставя да изсъхне.

Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над  $2 \text{ m}^2$ ), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа!

**3.1.5.** Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.

**3.1.6.** Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин.

#### **3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):**

**3.2.1.** Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, най-често са под формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода.

**3.2.2.** От етикета на дезинфектанта се избира концентрация на работния разтвор, постигаща вирусоцидно действие (минимум вируси с обвивка) или по-висока от нея.

**3.2.3.** Работните разтвори се изготвят с хладка вода, освен ако на етикета изрично не е посочена определена температура.

**3.2.4.** Обработката се извършва чрез *забърсване* с парцал, моп, кърпа, напоени с работния разтвор на дезинфектанта; чрез *опръскване* с работния разтвор на дезинфектанта или чрез *пенообразуващи машини*.

**3.2.5.** Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

**3.2.6.** Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните помещение.

**3.3. Техники за нанасяне на дезинфектантите при обработка на големи повърхности:**

*Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности.*

**3.3.1. Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа:**

**3.3.1.1.** Препоръчва се използването на система от мопове, предварително напоени с дезинфекционен разтвор. При този начин на обработка подът на едно помещение се обработва с един моп, а малките повърхности в едно помещение – с една кърпа. Следващо помещение/повърхност се обработват с нов моп/кърпа.

**3.3.1.2.** При липса на система от мопове се препоръчва използването на два съда (две кофи), съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С мопа се обтрива повърхност до  $10 \text{ m}^2$ , а с кърпата до  $2 \text{ m}^2$ . Следва последователно изпиране и потапяне на мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им използване върху друга повърхност.

**3.3.1.3.** Използваните кърпи и мопове, при всички случаи, подлежат на обеззаразяване след работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант в най-високата концентрация, посочена на етикета за съответното време на въздействие, след което се изпират и се оставят да изсъхнат.

**3.3.1.4.** При работа с хлорни дезинфектанти в санитарни помещения, обществени тоалетни и в други обекти, повърхностите, които ще влязат в контакт с кожата, като седалки на тоалетни чинии, столове, пейки и др., трябва задължително да бъдат забърсани с чиста суха или влажна кърпа или да бъдат обилно изплакнати с вода, след изтичане времето на въздействие на използвания дезинфектант.

**3.3.2. Дезинфекция чрез опръскване**

**3.3.2.1.** Може да се осъществи чрез ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или автоматични системи за „суха мъгла“.

**3.3.2.2.** Обширни обработки с гръбни и моторни пръскачки, и автоматизирани системи могат да се извършват само от регистрирани лица по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

**4. Допълнителни изисквания**

**4.1.** За всички обществени тоалетни, тоалетни в училища, детски заведения и за други обекти с обществено предназначение е необходимо да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете.

**4.2.** Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука.

**4.3.** Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства.

**4.4.** Личните предпазни средства се отстраняват внимателно.

**4.5.** Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.

**4.6.** Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.

**4.7.** След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт.

## **5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи**

### **5.1. Бактерицидни лампи от затворен тип**

**5.1.1.** Използват се за дезинфекция на въздух.

**5.1.2.** Могат да работят без прекъсване в присъствието на хора.

**5.1.3.** За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на въздушните UVC системи с обема на помещението, съгласно препоръките на производителя.

**5.1.4.** Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).

**5.1.5.** Изключително важно е подмяната на пурите, съгласно препоръките на производителя и/или ежегодното проследяване на UVC интензитета чрез измервателен уред (UVC-метър).

### **5.2. Бактерицидни лампи с директно UVC изльчване**

**5.2.1.** Използват се за дезинфекция на въздух и повърхности.

**5.2.2.** Да не се допуска достъп/присъствие на хора в помещениета в работен режим на директните изльчватели.

**5.2.3.** Препоръчва се използването на пури, които не продуцират озон (ozon-free).

**5.2.4.** Дезинфекция се постига при работа на лампите в продължителност 20-30 минути и минимум  $6 \mu\text{W}/\text{cm}^2$  UVC интензитет в целия обем на помещението.

**5.2.5.** За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на директните бактерицидни лампи с големината на помещението и мястото на монтирането им, с цел поддържане на минимум  $6 \mu\text{W}/\text{cm}^2$  UVC интензитет в целия обем на помещението.

**5.2.6.** Изключително важно е ежегодното проследяване на UVC интензитета на пурите, чрез измервателен уред (UVC-метър).

**5.2.6.** Ако директните бактерицидни лампи са били използвани ежедневно в продължение на 1 година или нерегулярино, но в продължение на повече от 3 години, и техните пури не са подменяни или контролирани, твърде вероятно е те да не изльчват ефективни дози UVC светлина, въпреки че светят в синьо-виолетова светлина. При липса на измервателен уред такива пури трябва да бъдат подменени, в противен случай не може да се гарантира постигане на дезинфекция.

**5.2.7.** По отношение на обеззаразяването на повърхности, директните бактерицидни лампи само подпомагат дезинфекцията с химични средства (дезинфектанти), но не я заместват!

## **6. Хигиена на ръцете (отнася се до всички служители, клиенти, ученици и деца в детски заведения)**

- 6.1.** Трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето си с ръце, особено в областта на носа, очите и устата.
- 6.2.** Трябва да бъдат насърчавани (чрез плакати, семинари, обучения, игри) да си мият ръцете редовно с вода и сапун.
  - 6.2.1.** Трябва да бъдат обучени на правилната техниката за обтриване на ръцете (да се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите);
  - 6.2.2.** Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност минимум 20 секунди.
- 6.3.** При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи ръце в продължение на минимум 30 секунди.
- 6.3.1.** Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете.
- 6.3.2.** След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да изсъхнат.*Необходимото време на обработка на кожата е посочено на етикета на дезинфектанта.*
- 6.4.** Препоръчва се поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на видими места в обществените обекти и на работните места.

Допълнителна важна информация:

Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV, Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020,

Насоките са налични на този адрес:

[https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/Guide\\_Cleaning.pdf](https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Epidemiologia/Guide_Cleaning.pdf)

Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020 Feb;; p. pii: S0195-6701(20)30046-3.

Публикацията е налична на този адрес:

[https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701\(20\)30046-3/fulltext](https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext)

#### **Насоки и съвети на СЗО за COVID-19:**

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/>

<https://www.epi-win.com/>